

Eslizón tridáctilo (*Chalcides striatus*)

Clasificación: Clase Reptiles, Orden Escamosos, Familia Scincidae

Especie: *Chalcides striatus*

Figuras de protección:

- EXTREMADURA.....DE INTERÉS ESPECIAL
- ESPAÑA.....DE INTERÉS ESPECIAL
- LIBRO ROJO DE ESPAÑA.....PREOCUPACIÓN MENOR
- CONVENIOS INTERNACIONALES.....CONVENIO DE BERNA III

FICHA

- Longitud: hasta 42 cm. de hocico a punta de la cola pero, generalmente más pequeño.
- Muy largo pero de poco grosor, parece una culebra debido a lo reducido de sus patas que poseen sólo tres dedos.
- Cabeza poco diferenciada del cuerpo, hocico romo y cola más larga que la cabeza y el tronco.
- Tímpano bien visible.
- Coloración verdosa, amarillenta, arena o bronce con varias líneas (de 9 a 13) más oscuras. Presente tonos metálicos.

Distribución: Lo encontramos en muchas zonas extremeñas como las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros, Campiña de Valencia de Alcántara, Sierra de Gata, Valle del Ambroz, Sierra de Hornachos, Valle de Santa Ana y Matamoros, Tentudía...


Hábitat: Zonas encharcadizas con abundante vegetación, prados de montaña, incluso jardines bien regados, no suele encontrarse en áreas con precipitaciones por debajo de los 500 mm. anuales.

Costumbres: Se muestra activo principalmente de día, si aprieta el calor restringe sus movimientos a sólo las primeras horas del día y a las últimas de la tarde. Es muy ágil, se mueve con extrema rapidez entre la vegetación. Durante los meses más fríos busca refugio para pasar el letargo invernal bajo troncos, piedras o en madrigueras de otros animales.

Alimentación: Su dieta se compone de invertebrados como grillos, saltamontes, orugas, gusanos, arañas, babosas...

Reproducción: El celo está comprendido entre los meses de marzo y junio, si coinciden varios machos en un territorio reducido surgen luchas entre ellos. Tras un periodo de entre 62 y 95 días después de la cópula, la hembra alumbrará entre una y quince crías perfectamente formadas. Adquieren la madurez sexual a los tres años.

Conservación: Muy localizado en sitios de hábitat favorable, es muy sensible a la alteración de este por lo tanto no tolera quema de rastrojos, abuso de herbicidas o grandes desbroces.



Distribución de *Chalcides striatus* en la comunidad autónoma de Extremadura y zonas potenciales de su presencia.



Eslizón ibérico (*Chalcides bedriagai*)

Clasificación: Clase Reptiles, Orden Escamosos, Familia Scincidae

Especie: *Chalcides bedriagai*

Figuras de protección:

- EXTREMADURA.....DE INTERÉS ESPECIAL
- ESPAÑADE INTERÉS ESPECIAL
- LIBRO ROJO ESPAÑOLCASI AMENAZADO
- CONVENIOS INTERNACIONALES.....CONVENIO DE BERNA II
.....DIRECTIVA HÁBITAT IV

FICHA

- Longitud: Hasta 17 cm. de hocico a punta de la cola, de los cuales la mitad corresponden a la cola.
- Patas muy cortas de cinco dedos.
- Presenta de 24 a 26 escamas lisas y brillantes en la línea transversal del centro del dorso.
- Oído bien visible, mayor que el orificio nasal.
- Color marrón, pardo, gris, oliva... con ocelos dispersos de color blanquecino o amarillento y borde oscuro. Banda gruesa y oscura en cada flanco; puede aparecer otra banda vertebral.

Distribución: Vegas del Guadiana, vertiente oeste de la Sierra de San Pedro, Tierra de Barros, Campiña Sur, Riberos del Tajo, Sierra de Gata, Valle del Ambroz, Sierra de Gredos.


Hábitat: Matorral mediterráneo, berrocales graníticos con abundante vegetación, arenales con cobertura vegetal, prados, bosques de caducifolios (donde se oculta entre las hojas del suelo)...

Costumbres: Activo durante el día, pero difícil de localizar puesto que sólo lo encontramos en zonas con abundante vegetación herbácea o matorrales. Suele aparecer cuando arrancamos plantas de raíz, al retirar hojas caídas en el suelo o al mover piedras grandes. Durante el invierno hibernan en grietas, troncos o madrigueras.

Alimentación: Captura todo tipo de invertebrados de alrededor de un centímetro de longitud del tipo escarabajos, hormigas, arañas...

Reproducción: Como en el *E. tridáctilo* el celo provoca enfrentamientos territoriales entre machos tras los cuales, se producen las cópulas. Cada hembra suele aparearse con varios machos. En torno a los setenta y cinco días después las hembras alumbran entre una y seis crías perfectamente formadas.

Conservación: La presión del hombre en su hábitat provocando el cambio de uso del suelo, los desbroces, los plaguicidas... pueden llevar a poblaciones locales a situaciones de alarma, incluso a su desaparición.



Distribución de *Chalcides bedriagai* en la comunidad autónoma de Extremadura y zonas potenciales de su presencia.



Eslizón de montaña (*Chalcides pistaciae*)

Clasificación: Clase Reptiles, Orden Escamosos, Familia Scincidae

Especie: *Chalcides pistaciae*

Figuras de protección:

- EXTREMADURA.....DE INTERÉS ESPECIAL
- ESPAÑA.....NO CATALOGADA
- LIBRO ROJO DE ESPAÑA.....NO CATALOGADA
- CONVENIOS INTERNACIONALES.....CONVENIO DE BERNA II
.....DIRECTIVA HÁBITAT IV

FICHA

- Longitud: Hasta 17 cm. de hocico a punta de la cola.
- Extremidades más largas que el E. ibérico, extendidas hacia delante sí alcanzan el oído mientras que en el eslizón ibérico no.
- Oído de mayor tamaño que el orificio nasal.
- Presenta 28 filas de escamas en la sección transversal del centro del dorso.
- Delante de la escama subocular existen tres supralabiales.
- De color pálido, presenta pequeños ocelos, excepcionalmente presenta línea vertebral y una banda ancha y oscura a cada lado del flanco.

Distribución: Límite provincial con Salamanca, Valle del Ambroz, Sierra de Montánchez, Límite sur con la provincia de Huelva. Es posible que aparezca en más zonas que no han sido muestreadas.

Hábitat: Alcornocales, rebollares con abundante vegetación herbácea del tipo helechos, pedregales húmedos, castaños... Siempre lugares frescos.


Costumbres: Activo durante el día si existen temperaturas suaves, muy ágil, se mueve con suma rapidez y es difícil divisarlo entre la vegetación. Durante el invierno pasa la hibernación en grietas, oquedades, bajo piedras... esperando la bondad de las temperaturas.

Alimentación: Pequeños invertebrados del tipo lombrices de tierra, grillos, saltamontes, arañas... siempre que sean de pequeño tamaño.

Reproducción: Es similar a las especies de eslizones anteriormente descritas, tras las luchas terri-

toriales entre los machos llegan las cópulas, y alrededor de dos meses y medio después las hembras alumbrarán pequeños eslizones completamente formados.

Conservación: Este eslizón, debido a las condiciones de su hábitat, parece tener más suerte que el resto pero, como siempre, las amenazas vienen impuestas por la mano del hombre con la roturación de zonas de montaña, construcción de bancales, tratamientos fitosanitarios agresivos, construcción de presas en las cabeceras de los ríos...



Distribución de *Chalcides pistaciae* en la comunidad autónoma de Extremadura y zonas potenciales de su presencia.



Culebrilla ciega (*Blanus cinereus*)

Clasificación: Clase Reptiles, Orden Escamosos, Familia Amphisbaenidae

Especie: *Blanus cinereus*

Figuras de Protección:

EXTREMADURADE INTERÉS ESPECIAL

ESPAÑA.....DE INTERÉS ESPECIAL

LIBRO ROJO DE ESPAÑAPREOCUPACIÓN MENOR

CONVENIOS INTERNACIONALES.....CONVENIO DE BERNA III

FICHA

- Longitud: Hasta 30 cm. de hocico a la punta de la cola.
- Coloración rosácea, violácea o gris, con el vientre más claro que el dorso; de aspecto de lombriz de tierra.
- El cuerpo es algo aplanado dorsoventralmente o cilíndrico, carece de extremidades.
- Cabeza pequeña, poco diferenciada, tan sólo separada del tronco por un surco transversal. Ojos diminutos.
- Escamas pequeñas de forma cuadrangular, agrupadas a modo de "anillos".

Distribución: Ampliamente distribuida en Extremadura, siempre que se den las condiciones de hábitat que a continuación se detallan.

Hábitat: Suelos sueltos, arenosos o con mucho humus, donde poder excavar sus galerías, aparece también bajo montones de estiércol. Necesita temperaturas altas y cierto grado de humedad. Normalmente ocupa la franja de los 150 a los 800 m.s.n.m. aunque puede aparecer a mayor altitud.


Costumbres: Está perfectamente adaptada a la vida subterránea, excava galerías y su actividad es tanto diurna como nocturna pero, también puede verse al aire libre aunque es menos frecuente.

Alimentación: Localiza a sus presas por el oído y en menor medida por el olfato. Su dieta se compone de pequeños insectos como hormigas o sus larvas.

Reproducción: El celo comienza a finales de febrero aunque, las cópulas duran hasta abril. La hembra pone un único huevo al comenzar el verano que eclosionará generalmente a finales de agosto o principios de septiembre.

Conservación: El exceso de roturación del suelo, la quema de rastrojos en áreas cultivadas y los desbroces son acusados negativamente por esta especie así como, el abuso de pesticidas.

Curiosidades: Aunque la especie es inofensiva, un dicho tradicional “si el liso viera y la víbora oyera no habría hombre que al campo saliera” la consideraba muy venenosa por auténtico desconocimiento de la especie.



Distribución de *Blanus cinereus* en la comunidad autónoma de Extremadura y zonas potenciales de su presencia.



Lución (*Anguis fragilis*)

Clasificación: Clase Reptiles, Orden Escamosos, Familia Anguidae

Especie: *Anguis fragilis*

Figuras de Protección:

- EXTREMADURADE INTERÉS ESPECIAL
- ESPAÑA.....DE INTERÉS ESPECIAL
- LIBRO ROJO DE ESPAÑAPREOCUPACIÓN MENOR
- CONVENIOS INTERNACIONALES.....CONVENIO DE BERNA III
.....DIRECTIVA HÁBITAT IV

FICHA

- Longitud: Hasta 50 cm. de hocico a punta de cola pero, generalmente menor.
- Coloración pardo, gris, crema o cobrizo. Puede presentar línea vertebral, costados y vientre oscuro. Muy brillante.
- Lagarto ápodo (sin patas), lo que le confiere un aspecto serpentiforme. El cuello es poco patente.
- El ojo presenta los párpados móviles.
- Presenta de veinticuatro a veintiséis escamas en la línea transversal media del cuerpo.

Distribución: Tan sólo aparece en el norte de la Comunidad. Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera.


Hábitat: Lugares con abundante humedad, está muy ligado al robledal, al castañar y los prados de montaña.

Costumbres: De movimientos lentos, se muestra activo al atardecer o por la noche por lo cual, es poco observado; podemos encontrarlo al levantar piedras o troncos. Resiste bien el frío y, en los meses invernales se refugia junto con otros individuos de su especie o, incluso de otras, para hibernar.

Alimentación: Se alimenta principalmente de invertebrados como babosas, escarabajos, lombrices, arañas... en ocasiones los adultos pueden preda sobre juveniles de lagartos o lagartijas e incluso, sobre individuos de su propia especie.

Reproducción: El celo comienza al terminar el letargo invernal, los machos se tornan agresivos con los individuos de su género con los que intercambian mordiscos. El acoplamiento con la hembra se produce tras sujetar el macho a esta mor-diéndola en el cuello y, mantener las colas entrelazadas. Las hembras paren entre seis y veintidós crías perfectamente formadas a final de verano o comienzos del otoño.

Conservación: Como su distribución es muy escasa en Extremadura, debemos cuidar especialmente su hábitat, es muy sensible a las alteraciones del medio, al uso de pesticidas, los incendios forestales y, es víctima frecuente de atropellos.



Distribución de *Anguis fragilis* en la comunidad autónoma de Extremadura y zonas potenciales de su presencia.

